

<i>Rodzaj dokumentu:</i>	<b>Zasady oceniania rozwiązań zadań</b>
<i>Egzamin:</i>	<b>Egzamin maturalny</b>
<i>Przedmiot:</i>	<b>Matematyka</b>
<i>Poziom:</i>	<b>Poziom rozszerzony</b>
<i>Formy arkusza:</i>	EMAP-R0-100-2106, EMAP-R0-200-2106, EMAP-R0-300-2106, EMAP-R0-400-2106, EMAP-R0-700-2106, EMAP-R0-Q00-2106
<i>Termin egzaminu:</i>	2 czerwca 2021 r.
<i>Data publikacji dokumentu:</i>	21 czerwca 2021 r.

**ZADANIA ZAMKNIĘTE**

Nr zadania	1.	2.	3.	4.
Odp.	D	D	B	D

**ZADANIE OTWARTE (KODOWANE)****Zadanie 5. (0–2)****Zasady oceniania**

2 pkt – odpowiedź poprawna.

0 pkt – odpowiedź niepoprawna, niepełna albo brak odpowiedzi.

**Rozwiązanie**

5	3	2
---	---	---

**ZADANIA OTWARTE (NIEKODOWANE)**

1. Akceptowane są wszystkie rozwiązania merytorycznie poprawne i spełniające warunki zadania.

2. Jeżeli zdający popełni błędy rachunkowe, które na żadnym etapie rozwiązania nie upraszczają i nie zmieniają danego zagadnienia, lecz stosuje poprawną metodę i konsekwentnie do popełnionych błędów rachunkowych rozwiązuje zadanie, to może otrzymać co najwyżej  $(n - 1)$  punktów (gdzie  $n$  jest maksymalną możliwą do uzyskania liczbą punktów za dane zadanie).

**Zadanie 6. (0–3)****Zasady oceniania**

**Zdający otrzymuje ..... 1 p.**

gdy podczas przekształcenia wyrażenia  $\log_3 54$  lub  $\frac{3 \log_2 9 + 2}{\log_2 9}$  poprawnie zastosuje wzór na zamianę podstaw logarytmu lub logarytm iloczynu/ilorazu, lub logarytm potęgi, np.:

$$\log_3 54 = \frac{\log_2 54}{\log_2 3}, \quad \log_2 9 = 2 \log_2 3, \quad \log_3 54 = \log_3 27 + \log_3 2$$

**Zdający otrzymuje ..... 2 p.**

gdy przekształci wyrażenie  $\log_3 54$  lub  $\frac{3 \log_2 9 + 2}{\log_2 9}$  lub oba te wyrażenia do takiej postaci, z której poprzez jednokrotne zastosowanie wzoru na zamianę podstaw logarytmu lub logarytm

iloczynu/ilorazu, lub logarytm potęgi oraz ewentualne kilkukrotne przekształcenie wyrażenia wymiernego uzyskuje się tezę.

**Zdający otrzymuje ..... 3 p.**

gdy, stosując poprawną metodę, przeprowadzi pełny dowód.

**Uwaga:**

Jeżeli zdający, przy rozpoczęciu przekształcania wyrażenia  $\log_3 54$  lub  $\frac{3\log_2 9 + 2}{\log_2 9}$ , popełnia błąd rzeczowy (niepoprawnie zastosuje wzór na zamianę podstaw logarytmu lub logarytm ilorazu/iloczynu, lub logarytm potęgi), lecz w dalszej części rozwiązania każdorazowo stosuje te wzory poprawnie, to może otrzymać za całe rozwiązanie co najwyżej **1 punkt**.

**Przykładowe pełne rozwiązanie**

Przekształcamy wyrażenie  $\log_3 54$ , stosując wzór na zamianę podstawy logarytmu:

$$\log_3 54 = \frac{\log_2 54}{\log_2 3}$$

Stosujemy wzór na logarytm iloczynu i otrzymujemy:

$$\frac{\log_2 54}{\log_2 3} = \frac{\log_2(27 \cdot 2)}{\log_2 3} = \frac{\log_2 27 + \log_2 2}{\log_2 3}$$

Aby doprowadzić do uzyskania w mianowniku wyrażenia  $\log_2 9$ , mnożymy licznik i mianownik przez 2, a następnie korzystamy ze wzoru na logarytm potęgi:

$$\frac{2 \cdot \log_2 27 + 2 \cdot \log_2 2}{2 \cdot \log_2 3} = \frac{\log_2 3^6 + 2}{\log_2 9} = \frac{3\log_2 9 + 2}{\log_2 9} = \frac{3c + 2}{c}$$

To należało wykazać.

**Zadanie 7. (0–3)****Zasady oceniania**

**Zdający otrzymuje** ..... **1 p.**  
gdy:

- zapisze, że trójkąt  $BEC$  jest podobny do trójkąta  $BFH$  oraz zapisze związek między wysokościami tych trójkątów opuszczonymi na prostą  $AB$  (lub zapisze związek między polami tych trójkątów), np.:  $h_{BEC} = 3h_{BFH}$  (lub  $P_{EBC} = 9S$ )

ALBO

- zapisze, że trójkąt  $ADG$  jest podobny do trójkąta  $AEC$  oraz zapisze związek między wysokościami tych trójkątów opuszczonymi na prostą  $AB$  (lub zapisze związek między polami tych trójkątów), np.:  $h_{AEC} = 2h_{ADG}$  (lub  $P_{AEC} = 4P_{ADG}$ )

ALBO

- zapisze związek między polami trójkątów  $AEC$  i  $EBC$ , np.:  $P_{AEC} = \frac{4}{3}P_{EBC}$

ALBO

- zapisze, że  $P_{ABC} = 21S$  i  $P_{EBC} = 9S$ .

**Zdający otrzymuje** ..... **2 p.**  
gdy:

- zapisze związki między polami trójkątów  $ADG$  i  $AEC$  oraz  $AEC$  i  $EBC$ , np.:  
 $\frac{P_{AEC}}{P_{EBC}} = \frac{4}{3}$  i  $P_{AEC} = 4P_{ADG}$

ALBO

- zapisze związki między polami trójkątów  $BEC$  i  $BFH$  oraz  $AEC$  i  $EBC$ , np.:  
 $\frac{P_{AEC}}{P_{EBC}} = \frac{4}{3}$  i  $P_{BEC} = 9P_{BFH}$

ALBO

- zapisze związki między polami trójkątów  $ADG$  i  $AEC$  oraz  $BEC$  i  $BFH$ , np.:  
 $P_{AEC} = 4P_{ADG}$  i  $P_{BEC} = 9P_{BFH}$

ALBO

- zapisze układ równań z polem  $p$  trapezu  $DECG$  oraz polem  $q$  trójkąta  $ADG$  jako niewiadomymi, np.:

$$\begin{cases} p + q = 12S \\ \frac{p + q}{q} = 4 \end{cases}$$

**Zdający otrzymuje** ..... **3 p.**  
gdy przeprowadzi pełne, poprawne rozumowanie.


**Uwaga:**

Jeśli zdający wprowadza do rozwiązania dodatkowe założenia, nie wynikające z treści zadania, to otrzymuje **0 punktów**, o ile nie nabył praw do innej punktacji.

## Przykładowe pełne rozwiązania

### Sposób 1.

Oznaczmy pole trójkąta  $FBH$  przez  $S$ , a długość odcinka  $FB$  przez  $x$ . Zgodnie z treścią zadania  $|AD| = |DE| = |EF| = 2|FB| = 2x$ .



Odcinki  $EC$  i  $FH$  są równoległe, więc trójkąt  $EBC$  jest podobny do trójkąta  $FBH$  na podstawie cechy kkk podobieństwa trójkątów. Z twierdzenia o stosunku pól figur podobnych i warunków zadania otrzymujemy

$$\frac{P_{EBC}}{P_{FBH}} = \left(\frac{|EB|}{|FB|}\right)^2 = \left(\frac{3x}{x}\right)^2 = 9$$

więc

$$P_{EBC} = 9S$$

Trójkąty  $EBC$  i  $AEC$  mają wspólną wysokość  $h$ , poprowadzoną z wierzchołka  $C$ . Zatem

$$\frac{P_{AEC}}{P_{EBC}} = \frac{\frac{1}{2} \cdot |AE| \cdot h}{\frac{1}{2} \cdot |EB| \cdot h} = \frac{4x}{3x} = \frac{4}{3}$$

więc

$$P_{AEC} = \frac{4}{3} \cdot P_{EBC} = 12S$$

Odcinki  $DG$  i  $EC$  są równoległe, więc trójkąt  $ADG$  jest podobny do trójkąta  $AEC$  na podstawie cechy kkk podobieństwa trójkątów. Z twierdzenia o stosunku pól figur podobnych i warunków zadania otrzymujemy

$$\frac{P_{ADG}}{P_{AEC}} = \left(\frac{|AD|}{|AE|}\right)^2 = \left(\frac{2x}{4x}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

więc

$$P_{ADG} = \frac{1}{4} \cdot P_{AEC} = 3S$$

To należało wykazać.

Sposób 2.

Oznaczmy przez  $h$  wysokość trójkąta  $BFH$ , natomiast przez  $a$  długość odcinka  $|FB|$ .

Wtedy pole trójkąta  $ABC$  jest równe  $P_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot 7a \cdot 3h = 21S$  oraz

$$P_{EBC} = \frac{1}{2} \cdot 3a \cdot 3h = 9S.$$

Odcinki  $DG$  i  $EC$  są równoległe, więc trójkąt  $ADG$  jest podobny do trójkąta  $AEC$  na podstawie cechy kkk podobieństwa trójkątów w skali  $k = 0,5$ . Niech pole trapezu  $DECG$  będzie równe  $p$ , natomiast pole trójkąta  $ADG$  będzie równe  $q$ .

Wtedy

$$\begin{cases} p + q = 12S \\ \frac{p + q}{q} = 4 \end{cases}$$

Stąd otrzymujemy  $p = 9S$  oraz  $q = 3S$ , co jest tezą twierdzenia.

**Zadanie 8. (0–4)****Zasady oceniania**

**Zdający otrzymuje** ..... **1 p.**

gdy zapisze równanie w postaci, w której występują funkcje trygonometryczne tego samego kąta, np.:  $2 \cos^2 x - \cos x = 2 \sin x \cos x - \sin x$ .

**Zdający otrzymuje** ..... **2 p.**

gdy zapisze alternatywę równań  $\cos x - \sin x = 0$  lub  $2 \cos x - 1 = 0$ .

**Zdający otrzymuje** ..... **3 p.**

gdy wyznaczy rozwiązania jednego z równań  $\cos x = \frac{1}{2}$  lub  $\cos x = \sin x$  w przedziale  $\langle 0, 2\pi \rangle$  lub w  $R$ .

**Zdający otrzymuje** ..... **4 p.**

gdy wyznaczy rozwiązania obu równań  $\cos x = \frac{1}{2}$  **oraz**  $\cos x = \sin x$  w przedziale  $\langle 0, 2\pi \rangle$ :

$$x = \frac{1}{3}\pi \text{ lub } x = \frac{5}{3}\pi \text{ lub } x = \frac{1}{4}\pi \text{ lub } x = \frac{5}{4}\pi.$$

**Uwagi:**

- Jeżeli zdający podzieli równanie przez  $(\cos x - \sin x)$  albo przez  $(2 \cos x - 1)$  bez stosownych założeń i nie rozważy przypadków, gdy to wyrażenie jest równe zero, to otrzymuje co najwyżej **2 punkty** za całe rozwiązanie.
- Jeżeli zdający przed uzyskaniem trygonometrycznych równań elementarnych popełni błędy rachunkowe i otrzyma równania elementarne, z których co najmniej jedno ma dwie serie rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych, to otrzymuje co najwyżej **3 punkty** za całe rozwiązanie.

### Przykładowe pełne rozwiązanie

Przekształcamy równanie równoważnie i otrzymujemy kolejno:

$$\begin{aligned}2 \cos^2 x - \cos x &= 2 \sin x \cos x - \sin x \\2 \cos^2 x - \cos x - 2 \sin x \cos x + \sin x &= 0 \\ \cos x \cdot (2 \cos x - 1) - \sin x \cdot (2 \cos x - 1) &= 0 \\ (2 \cos x - 1)(\cos x - \sin x) &= 0\end{aligned}$$

Stąd otrzymujemy:

$$\cos x = \frac{1}{2} \quad \text{lub} \quad \cos x = \sin x$$

Rozwiązaniami pierwszego z tych równań w zbiorze  $\langle 0, 2\pi \rangle$  są:  $x = \frac{1}{3}\pi$  lub  $x = \frac{5}{3}\pi$ .

Rozwiązaniami równania  $\cos x = \sin x$  w zbiorze  $\langle 0, 2\pi \rangle$  są:  $x = \frac{1}{4}\pi$  lub  $x = \frac{5}{4}\pi$ .

Zatem równanie  $2 \cos^2 x - \cos x = \sin(2x) - \sin x$  ma w zbiorze  $\langle 0, 2\pi \rangle$  cztery rozwiązania:  $x = \frac{1}{3}\pi$  lub  $x = \frac{5}{3}\pi$  lub  $x = \frac{1}{4}\pi$  lub  $x = \frac{5}{4}\pi$ .

### Zadanie 9. (0–4)

#### Zasady oceniania

**Zdający otrzymuje** ..... **1 p.**

gdy zapisze odległość punktu  $P = (x_p, y_p)$  od jednej z prostych, np.:

$$\frac{|x_p - 2y_p|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2}} \quad \text{lub} \quad \frac{|2x_p + y_p - 1|}{\sqrt{2^2 + 1^2}}$$

i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

**Zdający otrzymuje** ..... **2 p.**

gdy wyznaczy odległość punktu  $P = (x_p, y_p)$  od jednej z prostych w zależności od jednej zmiennej, np.

$$\begin{aligned}\frac{|x_p - 2(x_p + 4)|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2}} \quad \text{lub} \quad \frac{|2x_p + (x_p + 4) - 1|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} \quad \text{lub} \\ \frac{|(y_p - 4) - 2y_p|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2}} \quad \text{lub} \quad \frac{|2(y_p - 4) + y_p - 1|}{\sqrt{2^2 + 1^2}}\end{aligned}$$

i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

**Zdający otrzymuje** ..... **3 p.**

gdy zapisze równanie z jedną niewiadomą, opisujące zależność między odległościami punktu  $P = (x_p, y_p)$  od obu prostych, np.:

$$\frac{|x_P - 2(x_P + 4)|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2}} = 2 \cdot \frac{|2x_P + (x_P + 4) - 1|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} \quad \text{lub}$$

$$\frac{|(y_P - 4) - 2y_P|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2}} = 2 \cdot \frac{|2(y_P - 4) + y_P - 1|}{\sqrt{2^2 + 1^2}}$$

i na tym zakończy lub dalej popelni błędy.

**Zdający otrzymuje** ..... **4 p.**

gdy obliczy i zapisze współrzędne punktu  $P: P = (-2, 2)$  oraz  $P = \left(\frac{2}{5}, \frac{22}{5}\right)$ .

### Uwagi:

1. Jeśli zdający zapisuje równanie „odległości” i w tym równaniu pomija zupełnie symbol wartości bezwzględnej, to za całe rozwiązanie otrzymuje **0 punktów**.
2. Jeśli zdający sporządzi rysunek, zapisze współrzędne jednego z szukanych punktów  $(-2, 2)$ , obliczy odległości punktu  $(-2, 2)$  od prostych  $k$  i  $l$  oraz zapisze, że odległość tego punktu od prostej  $k$  jest dwa razy większa niż odległość tego punktu od prostej  $l$ , to otrzymuje **1 punkt** za całe rozwiązanie.

### Przykładowe pełne rozwiązanie

Niech  $P = (x_P, y_P)$  będzie punktem leżącym na prostej o równaniu  $y = x + 4$ . Wtedy  $y_P = x_P + 4$ .

Odległość  $d(P, k)$  punktu  $P$  od prostej  $k$  o równaniu  $x - 2y = 0$  jest równa

$$d(P, k) = \frac{|x_P - 2(x_P + 4)|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2}} = \frac{|-x_P - 8|}{\sqrt{5}}$$

Odległość  $d(P, l)$  punktu  $P$  od prostej  $l$  o równaniu  $2x + y - 1 = 0$  jest równa

$$d(P, l) = \frac{|2x_P + (x_P + 4) - 1|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{|3x_P + 3|}{\sqrt{5}}$$

Z treści zadania  $d(P, k) = 2 \cdot d(P, l)$ , więc

$$\frac{|-x_P - 8|}{\sqrt{5}} = 2 \cdot \frac{|3x_P + 3|}{\sqrt{5}}$$

Stąd otrzymujemy kolejno

$$|-x_P - 8| = 2 \cdot |3x_P + 3|$$

$$|-x_P - 8| = |6x_P + 6|$$

$$-x_P - 8 = 6x_P + 6 \quad \text{lub} \quad -(-x_P - 8) = 6x_P + 6$$

$$x_P = -2 \quad \text{lub} \quad x_P = \frac{2}{5}$$



Dla  $x_p = -2$  otrzymujemy  $P = (-2, 2)$ . Dla  $x_p = \frac{2}{5}$  otrzymujemy  $P = (\frac{2}{5}, \frac{22}{5})$ .  
Istnieją zatem dwa punkty spełniające warunki zadania:  $(-2, 2)$  oraz  $(\frac{2}{5}, \frac{22}{5})$ .

### Zadanie 10. (0–4)

#### Zasady oceniania

**Zdający otrzymuje** ..... **1 p.**

gdy:

- obliczy długości boków  $CF$  i  $CS$ :  $|CF| = 2\sqrt{2}$ ,  $|CS| = \sqrt{5}$

ALBO

- obliczy tylko długość boku  $|FS|$ :  $|FS| = 3$ .

**Zdający otrzymuje** ..... **2 p.**

gdy obliczy długości trzech boków trójkąta  $CFS$ :  $|CF| = 2\sqrt{2}$ ,  $|CS| = \sqrt{5}$  oraz  $|FS| = 3$ .

**Zdający otrzymuje** ..... **3 p.**


gdy zapisze zależność, wynikającą z twierdzenia cosinusów zastosowanego do trójkąta  $CFS$ , np.  $(\sqrt{5})^2 = (2\sqrt{2})^2 + 3^2 - 2 \cdot 2\sqrt{2} \cdot 3 \cdot \cos(\sphericalangle CFS)$ .

**Zdający otrzymuje** ..... **4 p.**

gdy wyznaczy miarę kąta  $CFS$ :  $|\sphericalangle CFS| = 45^\circ$ .

#### Przykładowe pełne rozwiązanie

Rozwiązanie rozpoczniemy od obliczenia długości boków trójkąta  $CFS$ . Mamy oczywiście  $|CF| = 2\sqrt{2}$  oraz  $|CS| = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$ .  
Dorysujmy teraz odcinek  $FH$ .



Oczywiście  $|\sphericalangle FHS| = 90^\circ$ , więc

$$|FS| = \sqrt{|FH|^2 + |HS|^2} = \sqrt{(2\sqrt{2})^2 + 1^2} = 3$$

Trójkąt  $CFS$  ma zatem boki o następujących długościach:  $|CF| = 2\sqrt{2}$ ,  $|CS| = \sqrt{5}$  oraz  $|FS| = 3$ .

Najmniejszy kąt wewnętrzny trójkąta znajduje się naprzeciw najkrótszego boku, zatem jest nim kąt  $CFS$ .

Z twierdzenia cosinusów zastosowanego do trójkąta  $CFS$  wynika, że

$$|CS|^2 = |CF|^2 + |FS|^2 - 2 \cdot |CF| \cdot |FS| \cdot \cos(\sphericalangle CFS)$$

Stąd otrzymujemy

$$(\sqrt{5})^2 = (2\sqrt{2})^2 + 3^2 - 2 \cdot 2\sqrt{2} \cdot 3 \cdot \cos(\sphericalangle CFS)$$

$$5 = 8 + 9 - 12\sqrt{2} \cdot \cos(\sphericalangle CFS)$$

$$\cos(\sphericalangle CFS) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

więc najmniejszy kąt w trójkącie  $CFS$  ma miarę  $45^\circ$ .

#### Zadanie 11. (0–4)

##### Zasady oceniania

**Zdający otrzymuje** ..... **1 p.**  
gdy:

- poprawnie poda liczbę możliwych rozmieszczeń wszystkich uczestników programu, np.  $(n + 3)!$

ALBO

- poprawnie poda liczbę możliwych rozmieszczeń, w których sportowcy siedzą obok siebie np.  $(n + 1) \cdot 3! \cdot n!$ .

**Zdający otrzymuje** ..... **2 p.**

gdy poprawnie poda liczbę możliwych rozmieszczeń, w których sportowcy siedzą obok siebie, np.  $(n + 1) \cdot 3! \cdot n!$  lub innym rozumowaniem  $3! \cdot (n + 1)!$  oraz liczbę wszystkich rozmieszczeń  $(n + 3)!$ .

**Zdający otrzymuje** ..... **3 p.**

gdy zapisze równanie  $\frac{6}{(n+2)(n+3)} = \frac{1}{15}$ .

**Zdający otrzymuje** ..... **4 p.**

gdy poprawnie obliczy liczbę aktorów: 7.

### Przykładowe pełne rozwiązanie

Niech  $n$  oznacza liczbę aktorów uczestniczących w programie ( $n \in \mathbb{N}$ ), natomiast  $A$  – zdarzenie polegające na tym, że trójka sportowców będzie siedziała obok siebie przy losowym wyborze miejsc. Wtedy

$$P(A) = \frac{3! \cdot (n+1)!}{(n+3)!}$$

Stąd po uproszczeniu otrzymujemy

$$P(A) = \frac{6}{(n+2)(n+3)}$$

Z treści zadania otrzymujemy równanie

$$\frac{6}{(n+2)(n+3)} = \frac{1}{15}$$

co prowadzi do

$$(n+2)(n+3) = 90$$

$$n^2 + 5n - 84 = 0$$

$$(n-7)(n+12) = 0$$

Zatem  $n = 7$ , gdyż  $n = -12$  przeczy założeniom. W tym programie bierze zatem udział 7 aktorów.

**Zadanie 12. (0–5)****Zasady oceniania****Zdający otrzymuje** ..... **1 p.**

gdy:

- zapisze, że liczba 3 jest jednym z rozwiązań równania i liczba 3 musi być jednokrotnym pierwiastkiem trójmianu kwadratowego  $x^2 + (m - 1)x - 6m^2 + 2m$

ALBO

- zapisze, że  $\Delta = 0$  i  $x_0 \neq 3$  (tj. dwukrotny pierwiastek trójmianu jest różny od 3)

ALBO

- rozwiąże równanie  $\Delta = 0$ , otrzymując  $m = \frac{1}{5}$ .

**Zdający otrzymuje** ..... **2 p.**

gdy:

- rozwiąże równanie  $\Delta = 0$ , otrzymując  $m = \frac{1}{5}$  i sprawdzi, że dla  $m = \frac{1}{5}$  trójmian  $x^2 + (m - 1)x - 6m^2 + 2m$  ma jeden pierwiastek podwójny różny od liczby 3

ALBO

- zapisze, że liczba 3 jest jednym z rozwiązań równania i wyznaczy pierwiastki trójmianu  $x^2 + (m - 1)x - 6m^2 + 2m$ :

$$x_1 = \frac{-m + 1 - |5m - 1|}{2} \quad \text{i} \quad x_2 = \frac{-m + 1 + |5m - 1|}{2}$$

**Zdający otrzymuje** ..... **3 p.**

gdy:

- zapisze, że liczba 3 jest jednym z rozwiązań równania, wyznaczy pierwiastki  $x_1$  oraz  $x_2$  trójmianu  $x^2 + (m - 1)x - 6m^2 + 2m$  i zapisze je bez użycia wartości bezwzględnej:  $x_1 = 2m$  oraz  $x_2 = -3m + 1$

ALBO

- zapisze równanie  $3^2 + (m - 1) \cdot 3 - 6m^2 + 2m = 0$ .

**Zdający otrzymuje** ..... **4 p.**

gdy:

- zapisze alternatywę  $(m = \frac{1}{5} \quad \text{i} \quad m \neq \frac{3}{2})$  lub  $(m \neq \frac{1}{5} \quad \text{i} \quad m = \frac{3}{2})$  lub  $(m \neq \frac{1}{5} \quad \text{i} \quad m = -\frac{2}{3})$

ALBO

- rozwiąże równanie  $3^2 + (m - 1) \cdot 3 - 6m^2 + 2m = 0$ .

**Zdający otrzymuje** ..... **5 p.**gdy zastosuje poprawną metodę i otrzyma poprawny wynik:  $m = -\frac{2}{3}$  lub  $m = \frac{1}{5}$  lub  $m = \frac{3}{2}$ .

**Uwaga:**

Jeśli zdający popełnia błąd, zapisując  $\sqrt{\Delta} = \sqrt{(5m - 1)^2} = 5m - 1$  i konsekwentnie do tego błędu rozwiąże zadanie do końca, to otrzymuje co najwyżej **3 punkty** za całe rozwiązanie.

**Przykładowe pełne rozwiązania**

Sposób 1.

Jednym z rozwiązań równania jest liczba  $x_3 = 3$ . Jeśli podane równanie ma mieć dokładnie dwa rozwiązania, to trójmian kwadratowy  $x^2 + (m - 1)x - 6m^2 + 2m$  powinien mieć pierwiastek podwójny inny niż 3 albo dwa różne pierwiastki, z których jeden jest równy 3.

Obliczamy wyróżnik trójmianu  $x^2 + (m - 1)x - 6m^2 + 2m$ :

$$\Delta = (m - 1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-6m^2 + 2m) = 25m^2 - 10m + 1 = (5m - 1)^2$$

Zatem dla każdej liczby rzeczywistej  $m$  ten wyróżnik przyjmuje wartość nieujemną. Pierwiastkami tego trójmianu są więc liczby

$$x_1 = \frac{-m + 1 - |5m - 1|}{2} \quad \text{i} \quad x_2 = \frac{-m + 1 + |5m - 1|}{2}$$

Dla  $m \in \left(-\infty, \frac{1}{5}\right)$  otrzymujemy

$$x_1 = \frac{-m + 1 + 5m - 1}{2} = 2m \quad \text{i} \quad x_2 = \frac{-m + 1 - 5m + 1}{2} = -3m + 1$$

Dla  $m \in \left[\frac{1}{5}, +\infty\right)$  otrzymujemy

$$x_1 = \frac{-m + 1 - 5m + 1}{2} = -3m + 1 \quad \text{i} \quad x_2 = \frac{-m + 1 + 5m - 1}{2} = 2m$$

Zatem, z dokładnością do oznaczeń, dla każdego  $m \in R$  zachodzi  $x_1 = 2m$  oraz  $x_2 = -3m + 1$ .

Należy zatem rozpatrzyć trzy sytuacje:

$(\Delta = 0 \text{ i } x_1 \neq 3)$  lub  $(\Delta > 0 \text{ i } x_1 = 3)$  lub  $(\Delta > 0 \text{ i } x_2 = 3)$ .

Rozpatrując każdą z nich, otrzymujemy odpowiednio:

$(m = \frac{1}{5} \text{ i } m \neq \frac{3}{2})$  lub  $(m \neq \frac{1}{5} \text{ i } m = \frac{3}{2})$  lub  $(m \neq \frac{1}{5} \text{ i } m = -\frac{2}{3})$

$$m = \frac{1}{5} \quad \text{lub} \quad m = \frac{3}{2} \quad \text{lub} \quad m = -\frac{2}{3}$$

Zatem podane w treści zadania równanie ma dokładnie dwa rozwiązania dla  $m \in \left\{-\frac{2}{3}, \frac{1}{5}, \frac{3}{2}\right\}$ .

Sposób 2.

Jednym z rozwiązań równania jest liczba  $x_3 = 3$ . Jeśli podane równanie ma mieć dokładnie dwa rozwiązania, to trójmian kwadratowy  $x^2 + (m - 1)x - 6m^2 + 2m$  powinien mieć pierwiastek podwójny inny niż 3 albo dwa różne pierwiastki, z których jeden jest równy 3.

Obliczamy wyróżnik trójmianu  $x^2 + (m - 1)x - 6m^2 + 2m$ :

$$\Delta = (m - 1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-6m^2 + 2m) = 25m^2 - 10m + 1 = (5m - 1)^2$$

Dla  $m = \frac{1}{5}$  trójmian ma dwukrotny pierwiastek  $x_0 = \frac{-m+1}{2} = \frac{2}{5}$  różny od 3.

Sprawdzamy, dla jakich wartości  $m$  liczba 3 jest pierwiastkiem trójmianu  $x^2 + (m - 1)x - 6m^2 + 2m$ :

$$3^2 + (m - 1) \cdot 3 - 6m^2 + 2m = 0$$

$$-6m^2 + 5m + 6 = 0$$

$$m = \frac{3}{2} \quad \text{lub} \quad m = -\frac{2}{3}$$

Ponieważ dla każdej z tych otrzymanych wartości  $m = \frac{3}{2}$  oraz  $m = -\frac{2}{3}$  wyróżnik  $\Delta$  jest większy od zera, więc w obu przypadkach trójmian  $x^2 + (m - 1)x - 6m^2 + 2m$  ma dwa różne pierwiastki, z których jeden jest równy 3.

Zatem podane w treści zadania równanie ma dokładnie dwa rozwiązania dla  $m \in \left\{-\frac{2}{3}, \frac{1}{5}, \frac{3}{2}\right\}$ .

**Zadanie 13. (0–5)**

**Zasady oceniania**

**Zdający otrzymuje** ..... **1 p.**

gdy:

- obliczy pochodną funkcji  $f: f'(x) = \frac{2x^3 - k}{x^2} =$  dla  $x \neq 0$

ALBO

- zapisze równanie wynikające z faktu, że punkt styczności należy do wykresu funkcji  $f$ :

$$-x_0 = \frac{x_0^3 + k}{x_0}$$

ALBO

- skorzysta z geometrycznej interpretacji pochodnej funkcji w punkcie i zapisze równanie:  $f'(x_0) = -1$

**Zdający otrzymuje** ..... **2 p.**

gdy skorzysta z geometrycznej interpretacji pochodnej funkcji w punkcie i zapisze równanie:

$$\frac{2x_0^3 - k}{x_0^2} = -1.$$

**Zdający otrzymuje** ..... **3 p.**

gdy zapisze układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi  $x_0$  oraz  $k$  prowadzący do

wyznaczenia parametru  $k$ , np.:  $-x_0 = \frac{x_0^3 + k}{x_0}$  i  $\frac{2x_0^3 - k}{x_0^2} = -1$ .

**Zdający otrzymuje** ..... **4 p.**

gdy obliczy z układu równań  $-x_0 = \frac{x_0^3 + k}{x_0}$  i  $\frac{2x_0^3 - k}{x_0^2} = -1$  niewiadomą  $x_0$ :  $x_0 = -\frac{2}{3}$ .

**Uwaga:**

Wystarczy, że zdający rozwiąże równanie  $3x_0^3 = -2x_0^2$  w zbiorze  $\mathbb{R}$ :  $x_0 = -\frac{2}{3}$ ,  $x_0 = 0$ .

**Zdający otrzymuje** ..... **5 p.**

gdy zastosuje poprawną metodę i uzyska poprawny wynik:  $k = -\frac{4}{27}$ .

**Uwagi:**

1 Jeśli zdający przy wyznaczaniu pochodnej popełnia błąd w potęgze zmiennej lub traktuje parametr  $k$  jako zmienną, to może otrzymać co najwyżej **1 punkt** za zapisanie warunku

$$-x_0 = \frac{x_0^3 + k}{x_0} \text{ lub za zapisanie, że } f'(x_0) = -1.$$

2. Jeśli zdający, obliczając pochodną funkcji  $f$ , zapisze  $f'(x) = \frac{2x^3 + k}{x^2}$  (tj. błędnie ustali znak przed współczynnikiem  $k$ ), to błąd ten traktujemy jako błąd rachunkowy.

**Przykładowe pełne rozwiązanie**

Niech punkt  $P = (x_0, y_0)$ , gdzie  $x_0 \neq 0$ , będzie punktem styczności prostej  $y = -x$  do wykresu funkcji  $f$ . Wtedy  $y_0 = -x_0$ , więc

$$-x_0 = \frac{x_0^3 + k}{x_0}$$

Pochodna funkcji  $f$  jest równa

$$f'(x) = \frac{3x^2 \cdot x - (x^3 + k) \cdot 1}{x^2} = \frac{2x^3 - k}{x^2}$$

dla każdej liczby rzeczywistej  $x \neq 0$ .

Z warunków zadania wynika, że współczynnik kierunkowy stycznej jest równy  $(-1)$ ; jest on

wartością pochodnej dla  $x_0$ . Zatem  $\frac{2x_0^3 - k}{x_0^2} = -1$ . Otrzymujemy układ równań

$$-x_0 = \frac{x_0^3 + k}{x_0} \quad \text{i} \quad \frac{2x_0^3 - k}{x_0^2} = -1$$

Dla  $x_0 \neq 0$  jest on równoważny układowi

$$x_0^3 + k = -x_0^2 \quad \text{i} \quad 2x_0^3 - k = -x_0^2$$

Stąd otrzymujemy równanie  $3x_0^3 = -2x_0^2$ .

Ponieważ  $x_0 \neq 0$ , więc dzieląc obie strony tego równania przez  $3x_0^2$ , otrzymujemy  $x_0 = -\frac{2}{3}$ .

Zatem  $k = -x_0^3 - x_0^2 = \frac{8}{27} - \frac{4}{9} = -\frac{4}{27}$ .



### Zadanie 14. (0–5)

#### Zasady oceniania

**Zdający otrzymuje ..... 1 p.**

gdy zapisze równanie z jedną niewiadomą (długością boku  $AB$  albo  $AD$ ), wynikające z twierdzenia cosinusów zastosowanego do trójkąta  $ABD$ , np.

$$|AB|^2 = (2|AB|)^2 + 6^2 - 2 \cdot 2 \cdot |AB| \cdot 6 \cdot \cos(\sphericalangle ADB)$$

**Zdający otrzymuje ..... 2 p.**

gdy obliczy długość boku  $AB$  lub  $AD$ :  $|AB| = 4$ ,  $|AD| = 8$ .

**Zdający otrzymuje ..... 3 p.**

gdy zastosuje twierdzenie o czworokącie opisanym na okręgu oraz twierdzenie Pitagorasa

i zapisze układ równań z niewiadomymi  $|BC|$  i  $|CD|$ : 
$$\begin{cases} |CD| = |BC| + 4 \\ |BC|^2 + |CD|^2 = 36 \end{cases}$$

**Zdający otrzymuje ..... 4 p.**

gdy nie odrzuci rozwiązania  $|AB| = 3$ , rozwiąże dwa równania:

$$|BC|^2 + (|BC| + 4)^2 = 36 \quad \text{oraz} \quad |BC|^2 + (|BC| + 3)^2 = 36$$

i zapisze dwa dodatnie rozwiązania tych równań:  $|BC| = -2 + \sqrt{14}$  oraz  $|BC| = \frac{-3 + 3\sqrt{7}}{2}$ .

**Zdający otrzymuje ..... 5 p.**


gdy zastosuje poprawną metodę i otrzyma poprawny wynik:  $|BC| = -2 + \sqrt{14}$ .

#### Uwagi:

1. Jeśli zdający zakłada błędnie, że  $\cos(\sphericalangle BAD) = \frac{7}{8}$  i konsekwentnie rozwiąże zadanie do końca, to otrzymuje co najwyżej **2 punkty**.
2. Jeśli zdający zakłada błędnie, że  $|AB| = 2 \cdot |AD|$  i konsekwentnie rozwiąże zadanie do końca, to otrzymuje co najwyżej **2 punkty**.
3. Jeśli zdający zapisze równanie z dwiema niewiadomymi, wynikające z twierdzenia o czworokącie opisanym na okręgu oraz z twierdzenia Pitagorasa zastosowanego do trójkąta  $BCD$ , np.:  $|AB| + \sqrt{36 - |BC|^2} = |BC| + 2 \cdot |AB|$  i na tym zakończy, to otrzymuje **1 punkt**.

#### Przykładowe pełne rozwiązanie

Oznaczmy  $a = |AB|$ .



Do trójkąta  $ABD$  stosujemy twierdzenie cosinusów i otrzymujemy

$$a^2 = (2a)^2 + 6^2 - 2 \cdot 2a \cdot 6 \cdot \cos(\sphericalangle ADB)$$

Ponieważ  $\cos(\sphericalangle ADB) = \frac{7}{8}$ , więc

$$a^2 = (2a)^2 + 6^2 - 2 \cdot 2a \cdot 6 \cdot \frac{7}{8}$$

$$a^2 - 7a + 12 = 0$$

$$a = 3 \quad \text{lub} \quad a = 4$$

i po uwzględnieniu warunku  $|AB| > \sqrt{15}$  otrzymujemy  $|AB| = 4$  oraz  $|AD| = 8$ .  
Korzystamy z twierdzenia o czworokącie opisanym na okręgu i otrzymujemy

$$|AB| + |CD| = |BC| + |AD|$$

$$4 + |CD| = |BC| + 8$$

$$|CD| = |BC| + 4$$

Stosujemy twierdzenie Pitagorasa w trójkącie prostokątnym  $BCD$  i otrzymujemy kolejno:

$$|BC|^2 + (|BC| + 4)^2 = |BD|^2$$

$$|BC|^2 + (|BC| + 4)^2 = 36$$

$$|BC|^2 + 4|BC| - 10 = 0$$

$$|BC| = -2 - \sqrt{14} \quad \text{lub} \quad |BC| = -2 + \sqrt{14}$$

Ponieważ  $-2 - \sqrt{14} < 0$ , więc  $|BC| = -2 + \sqrt{14}$ .

**Zadanie 15. (0–7)**

Łącznie za zadanie zdający może otrzymać 7 punktów: 2 punkty za rozwiązanie podpunktu a), 1 punkt za rozwiązanie podpunktu b) oraz 4 punkty za rozwiązanie podpunktu c).

**Zasady oceniania dla podpunktu a)**

**Zdający otrzymuje** ..... 1 p.

gdy:

- zapisze równość wynikającą z twierdzenia Pitagorasa oraz podanego obwodu tego trójkąta, np.  $(4 - (x + b))^2 = x^2 + b^2$

ALBO

- zapisze układ równań  $x^2 + y^2 = c^2$  i  $y = 4 - x - c$ .

**Zdający otrzymuje** ..... 2 p.

gdy wykaże, że pole  $P$  trójkąta  $ABC$  jako funkcja zmiennej  $x$  wyraża się wzorem

$$P(x) = \frac{x(4-2x)}{4-x}.$$

**Zasady oceniania dla podpunktu b)**

**Zdający otrzymuje** ..... 1 p.

gdy zapisze, że dziedziną funkcji  $P$  jest przedział liczbowy  $(0, 2)$ .

**Uwagi:**

1. Punkt za wyznaczenie dziedziny funkcji zdający otrzymuje niezależnie od realizacji podpunktu a) zadania, pod warunkiem, że rozważy wyznaczoną przez siebie funkcję jednej zmiennej.

**Zasady oceniania dla podpunktu c)**

**Zdający otrzymuje** ..... 1 p.

gdy wyznaczy pochodną funkcji  $P$ :  $P'(x) = \frac{2x^2 - 16x + 16}{(4-x)^2}$ , gdzie  $x \in (0, 2)$ .

**Zdający otrzymuje** ..... 2 p.

gdy zastosuje warunek konieczny istnienia ekstremum funkcji  $P$  i obliczy miejsca zerowe pochodnej  $P'$ :  $x = 4 - 2\sqrt{2}$ .

**Zdający otrzymuje** ..... 3 p.

gdy zbada znak pochodnej funkcji  $P$  oraz wyznaczy (z uzasadnieniem) wartość zmiennej  $x$ , dla której funkcja  $P$  przyjmuje wartość największą, np.:

$$P'(x) > 0 \text{ dla } x \in (0, 4 - 2\sqrt{2})$$

$$P'(x) < 0 \text{ dla } x \in (4 - 2\sqrt{2}, 2)$$

Funkcja  $P$  jest rosnąca w przedziale  $(0, 4 - 2\sqrt{2})$  oraz malejąca w przedziale  $[4 - 2\sqrt{2}, 2)$ , więc w punkcie  $x = 4 - 2\sqrt{2}$  funkcja  $P$  osiąga największą wartość.

**Zdający otrzymuje** ..... **4 p.**

gdy zapisze, że przy podanym obwodzie równym 4, największe pole równe  $4(3 - 2\sqrt{2})$  ma trójkąt o bokach  $4 - 2\sqrt{2}$ ,  $4 - 2\sqrt{2}$  i  $4\sqrt{2} - 4$ .

**Uwagi:**

- Jeżeli zdający wyznaczy pochodną funkcji  $P$  z błędem, ale wyznaczona pochodna jest funkcją wymierną postaci  $\frac{ax^2+bx+c}{(4-x)^2}$ , gdzie  $ax^2 + bx + c$  jest trójmianem kwadratowym, mającym wyróżnik dodatni, to zdający może otrzymać punkty za obliczenie miejsc zerowych pochodnej i wyznaczenie argumentu, dla którego pole osiąga największą wartość, o ile konsekwentnie do popełnionego błędu obliczy miejsca zerowe pochodnej lub uzasadni istnienie największej wartości rozważanej funkcji.
- Badanie znaku pochodnej zdający może opisać w inny sposób, np. szkicując wykres funkcji, która w ten sam sposób jak pochodna zmienia znak.
- Za poprawne uzasadnienie, że rozważana funkcja posiada wartość największą dla wyznaczonej wartości  $x$ , przy której pochodna się zeruje, można uznać sytuacje, gdy zdający:
  - opisuje, słownie lub graficznie (np. przy użyciu strzałek), monotoniczność funkcji  $P$ ;
  - zapisuje, że dla wyznaczonej wartości  $x$  funkcja  $P$  ma maksimum lokalne i jest to jednocześnie jej największa wartość.
 Jeżeli zdający nie przedstawi takiego uzasadnienia, to może otrzymać co najwyżej **2 punkty** (otrzymuje punkty za wyznaczenie pochodnej funkcji  $P$  oraz wyznaczenie miejsc zerowych pochodnej funkcji  $P$ ).
- Punkt za wyznaczenie największej wartości funkcji  $P$  i długości boków trójkąta o największym polu zdający otrzymuje wtedy, gdy otrzymał punkt za poprawne uzasadnienie, że funkcja  $P$  osiąga wartość największą w punkcie  $x = 4 - 2\sqrt{2}$ .

**Przykładowe pełne rozwiązanie**

a) i b)

Przyjmijmy następujące oznaczenia:  $b = |BC|$ ,  $c = |AB|$ .

Z warunków zadania  $x + b + c = 4$ , więc  $c = 4 - (x + b)$ .

Stosujemy twierdzenie Pitagorasa do trójkąta  $ABC$  i otrzymujemy

$$c^2 = x^2 + b^2$$

$$[4 - (x + b)]^2 = x^2 + b^2$$

$$b(4 - x) = 8 - 4x$$

$$b = \frac{8 - 4x}{4 - x}, \quad \text{gdzie } \frac{8 - 4x}{4 - x} > 0 \text{ i } 0 < x < 4$$

Wyznaczamy pole tego trójkąta, jako funkcję długości  $x$  jego przyprostokątnej  $AC$ :

$$P = \frac{1}{2} \cdot x \cdot b = \frac{1}{2} \cdot x \cdot \frac{8-4x}{4-x} = \frac{x(4-2x)}{4-x}$$

gdzie  $\frac{8-4x}{4-x} > 0$  i  $0 < x < 4$ .

Wyznaczamy dziedzinę funkcji  $P$ :

$$\frac{8-4x}{4-x} > 0 \text{ i } 0 < x < 4$$

$$0 < x < 2$$

Obliczamy pochodną funkcji  $P$ :

$$P'(x) = \frac{(4x-2x^2)' \cdot (4-x) - (4x-2x^2) \cdot (4-x)'}{(4-x)^2} = \frac{2x^2 - 16x + 16}{(4-x)^2}$$

dla  $x \in (0, 2)$ .

Obliczamy miejsce zerowe funkcji  $P'$ :

$$\frac{2x^2 - 16x + 16}{(4-x)^2} = 0$$

$$2x^2 - 16x + 16 = 0$$

$$\Delta = (-16)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 16 = 8 \cdot 16$$

$$x = \frac{16 + 8\sqrt{2}}{4} = 4 + 2\sqrt{2} \notin (0, 2) \quad \text{lub} \quad x = \frac{16 - 8\sqrt{2}}{4} = 4 - 2\sqrt{2} \in (0, 2)$$

Badamy monotoniczność funkcji  $P$ :

$$P'(x) > 0 \text{ dla } x \in (0, 4 - 2\sqrt{2})$$

$$P'(x) < 0 \text{ dla } x \in (4 - 2\sqrt{2}, 2)$$

Zatem

funkcja  $P$  jest rosnąca w przedziale  $(0, 4 - 2\sqrt{2}]$ ,

funkcja  $P$  jest malejąca w przedziale  $[4 - 2\sqrt{2}, 2)$ .

Stąd w punkcie  $x = 4 - 2\sqrt{2}$  funkcja  $P$  osiąga największą wartość.

c)

$$\text{Gdy } x = 4 - 2\sqrt{2}, \text{ to wtedy } b = \frac{8-4x}{4-x} = \frac{4(2\sqrt{2}-2)}{2\sqrt{2}} = 4 - 2\sqrt{2}.$$

$$\text{Zatem } c = x\sqrt{2} = 4\sqrt{2} - 4 \text{ i } P(4 - 2\sqrt{2}) = \frac{1}{2} \cdot x \cdot b = \frac{1}{2} \cdot (4 - 2\sqrt{2})^2 = 4(3 - 2\sqrt{2}).$$

Spośród rozważanych trójkątów największe pole ma trójkąt o bokach  $4 - 2\sqrt{2}$ ,  $4 - 2\sqrt{2}$  oraz  $4\sqrt{2} - 4$ . Pole tego trójkąta jest równe  $4(3 - 2\sqrt{2})$ .