










**Przebieg 1. Sporządzanie leku recepturowego**

*Uwaga. Podczas oceny dokładności odważania substancji egzaminator musi wziąć pod uwagę okoliczności/sytuacje, na które nie ma wpływu zdający, np. ruch powietrza powodujący zmianę odczytu na wagach z dokładnością 0,001 g nieposiadających osłony). Zdający:*

1	zdezynfekował stanowisko pracy								
2	umył ręce przed przystąpieniem do sporządzania leku, pracował w fartuchu ochronnym								
3	odważył w wytarowanej zlewce etanol 96% v/v								
4	odważył 0,2 g hydrokortyzonu na wytarowanym krążku pergaminowym, na wypoziomowanej wadze do proszków lub wadze wielozakresowej <i>Uwaga. Egzaminator ocenia po podniesieniu ręki przez zdającego i uzyskaniu zgody od przewodniczącego ZN.</i>								
5	rozpuścił hydrokortyzon w etanolu 96% v/v w zlewce (substancja <b>nie została</b> umieszczona w butelce w postaci stałej) <i>Uwaga. Egzaminator ocenia po zgłoszeniu gotowości przez zdającego i uzyskaniu zgody od przewodniczącego ZN.</i>								
6	odważył rezorcynol na wytarowanym krążku pergaminowym i rozpuścił rezorcynol w zlewce w wodzie, etanolu lub mieszaninie etanolu z wodą								
7	wymieszał wszystkie składniki leku recepturowego w zlewce bagietką lub w zakręconej butelce								
8	zachował porządek podczas sporządzania leku								
9	uporządkował stanowisko pracy (umieścił na tacy naczynia i utensylia, z których korzystał w trakcie egzaminu)								

Egzaminator .....

*imię i nazwisko*

.....

*data i czytelny podpis*